



STOCKHOLMS
REGIONDJURSJKUHUS

Vanligt förekommande faror som kan uppstå sommartid

Risken för vissa sjukdomar och besvär är större sommartid, även om de kan inträffa även under andra årstider, se nedan:

- *Trafiken*
- *Höga höjder* (öppna fönster och balkonger från vilka både hundar och katter kan falla ner ifrån).
- *Fiskekrokar* är mycket svåra att få bort om de fastnar i munnen eller i huden på din hund eller katt.
- *Nedfallna elledningar* kan ge kraftiga och i vissa fall dödliga elstötar.
- *Trasiga flaskor* (värst är de som döljer sig under vattnet vid badplatser).
- *Öppna eldar* (t ex vid grillning).
- *Rättgift* (tänk på att ta reda på vilken sorts rättgift som ditt djur har ätit före det att du uppsöker veterinär då detta är viktigt för din veterinär att veta).
- *Bollar* kan sväljas hela och fastna alternativt tuggas i småbitar som lätt fastnar i tarmen.
- *Öppna brunnar* kan både hundar och katter falla ner i.
- *Undvik att ge ben* från djur som börjar på F (fisk, fågel, fläsk och får) till hundar och katter.
- *Loppor* – ta att många loppor hör hemma på andra djur (t ex igelkottsloppor, fågelloppor) och inte är farliga för ditt djur. Ta med en loppa till en veterinärklinik så kan du få den artbestämd.
- *Skärsår/bitsår*: Eftersom både hundar och katter vistas ute mer när det är varmt och vackert väder är det vanligare med bitsår och skärsår under denna årstid. Se separat dokument.
- *Främmande föremål som fastnar i magen och tarmen*: Hundar äter gärna saker som luktar mat. Katter är mer kräsna. Exempel på sådant som ofta fastnar i matsmältningskanalen och måste opereras bort är majskolv-stockar, persikokärnor, glasspinnar, kasslernät och plastförpackningar. Se till att hålla sådant utom räckhåll för hunden. Om hunden svält något som fastnat kan symtomen vara kräkningar, upphörd matlust och buksmärter, ofta utan diarré eller normal avföring. Det förekommer att hundar får ett stort mägben att gnaga på. En stor hund kan dock tugga i sig ganska stora mängder ben på kort tid, och dessa benflisor bakar ihop sig som cement i tarmen. Följden blir en smärtsam förstoppning som kräver veterinärvård under flera dygn för att lösa. Om du misstänker att din hund eller katt svält något som kan fastna bör du kontakta veterinär snarast. Ju längre tid det tar innan ett sådant föremål avlägsnas, desto större är risken att tarmen skadas allvarligt och i värsta fall perforeras.
- *Grässtrån bakom mjuka gommen*: Katter som äter på grässtrån kan råka ut för att ett strävt grässtrå letar sig upp bakom gomseget och fastnar i bakre delen av näshålan.



**STOCKHOLMS
REGIONDJURSJUKHUS**

Eftersom grässträet har hullingar åt ena hållet är det svårt att dra det tillbaka ner i munhålan igen. Man måste då söva katten för att inspektera näshålan och avlägsna grässträt. Symtom kan vara att katten saliverar, slutar äta och dricka samt krafsar sig mot munnen. Man bör då uppsöka veterinär snarast.

- **Metkrokar:** Nyfikna hundar och katter vill gärna undersöka en fiskekrok, särskilt om den luktar fisk. Det händer då att kroken fastnar i huden. Eftersom det sitter en hulling på kroken kan den orsaka skada och smärta om man försöker dra tillbaka den med våld. Det är oftast nödvändigt att uppsöka veterinär som ger lugnande medel och avlägsnar kroken. Om du behöver klippa bort en del av kroken eller draget, lämna en del kvar som man kan få tag i när den ska tas bort. Om hunden eller katten har svält kroken kan den fastna i svalg eller matstrupe och då kan det bli mycket besvärligt att komma åt den, så håll fiskekrokar utom räckhåll för ditt djur.
- **Fall från hög höjd:** Det är mycket vanligt att katter ramlar ut från fönster och balkonger. De verkar inte ha något begrepp om att de kan skada sig, utan balanserar gärna på balkongräcken och fönsterkarmar, gör kanske ett utfall mot en fågel, och så ramlar de ner. Många katter överlever fall från höga höjder, men skadorna kan bli omfattande. Vanliga skador är lungblödningar, benbrott, tandskador, brusten urinblåsa, käkfrakturer och inre blödningar. Om din katt ramlar från en hög höjd bör du snarast ta kontakt med veterinär som kan undersöka och behandla eventuella skador.